

Palynziq
(pegvaliase injection)

IMPORTANT : Vous devez toujours avoir le dispositif d'injection et d'adrénaline et cette carte sur vous. En cas d'urgence, montrez cette carte au personnel médical.

PALYNZIQ^{MD} (pegvaliase injectable)
Carte d'alerte du patient

En cas d'urgence, communiquer avec :

Nom de la personne à contacter en cas d'urgence

Coordonnées de la personne à contacter en cas d'urgence

Nom du médecin

Coordonnées du médecin

Coordonnées du médecin en dehors des heures d'ouverture

Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouveaux renseignements relatifs à la sécurité. Vous pouvez nous aider en déclarant les effets secondaires que vous ressentez à BioMarin, soit par courriel à drugsafety@bmrn.com, soit en communiquant directement avec BioMarin Pharmaceutical Inc. au 1-866-906-6100. Les effets secondaires peuvent aussi être déclarés à l'aide des systèmes nationaux de déclaration. Les formulaires de déclaration et des renseignements sont disponibles sur le site <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>

BIO MARIN

©2022 BioMarin Pharmaceutical Inc.
All rights reserved. CA-PAL-00077 0722

Nom du patient : _____

Date de naissance : _____

Renseignements sur ses allergies : _____

Autres problèmes de santé (p. ex. asthme) : _____

La pegvaliase peut causer des réactions allergiques graves qui peuvent être mortelles; ces réactions peuvent survenir à n'importe quel moment après une injection de pegvaliase. **Arrêter les injections de pegvaliase si les symptômes suivants apparaissent.**

Les symptômes d'une réaction allergique grave peuvent inclure les suivants :

- Enflure du visage, des yeux, des lèvres, de la bouche, de la gorge, de la langue, des mains et/ou des pieds
- Difficultés respiratoires ou sibilances
- Sensation de gorge serrée ou d'étouffement
- Difficultés à avaler ou à parler
- Étourdissement ou évanouissement
- Incontinence urinaire ou fécale
- Battements de coeur rapides
- Éruption urticarienne (rash cutané boursoufflé avec démangeaisons) qui se propage rapidement
- Bouffées congestives
- Crampes ou douleurs à l'estomac intenses, vomissements ou diarrhée

Que faire si vous présentez une réaction allergique grave :

- SArrêtez les injections de pegvaliase.
- Utilisez le dispositif d'injection d'adrénaline selon les instructions de votre médecin.
- Demandez une assistance médicale d'urgence.

POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Ce patient est traité par la pegvaliase. Des réactions allergiques graves peuvent survenir avec l'utilisation de ce médicament.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la pegvaliase, consultez la monographie de produit. Veuillez déclarer toute réaction indésirable suspectée à drugsafety@bmrn.com ou à l'aide des systèmes nationaux de déclaration. Les formulaires de déclaration et des renseignements sont disponibles sur le site <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>

Scannez le code QR pour consulter la monographie du produit



Palynziq
(pegvaliase injection)